



Mayo skår

Parameter	Poeng			
	0	1	2	3
Avføringshyppighet	Normalt antall for pasienten	1-2 flere enn normalt	3-4 flere Enn normalt	≥ 5 flere Enn normalt
Rektalblødning	Ikke	Synlig blod i < 50 %	Synlig blod ved nesten hver tømning	Tøninger med blod og puss alene
Endoskopiske forandringer	Normal / inaktiv	Lette forandringer	Moderate forandringer	Uttalte forandringer
Legens vurdering	Normal	Mild	Moderat	Alvorlig


Endoskopisk vurdering av sykdomsaktivitet hos pasienter med UC i henhold til Mayo skår.




A. Endoskopisk skår 0: Normal slimhinne



B. Endoskopisk skår 1: Mild sykdom (erytem, redusert karmønster, lett økt lederbarhet)



C. Endoskopisk skår 2: Moderate sykdom (markert erytem, manglende karmønster, økt lederbarhet, erosjoner)



D. Endoskopisk skår 3: Alvorlig sykdom (spontane blødninger, ulcerasjoner)

K. W. Schroeder, W. J. Tremaine, and D. M. Ilstrup. Coated oral 5-aminosalicylic acid therapy for mildly to moderately active ulcerative colitis. A randomized study. *N.Engl.J.Med.* 317 (26):1625-1629, 1987.

Mayo skår – kliniske definisjoner

	Definisjon
Mayo skår	Summen av antall poeng som gis for antall avføringer (0-3), rektal blødning (0-3), legens vurdering (0-3) og funn ved endoskopi (0-3) • Antall poeng varierer fra 0-12 • Høyere skår = mer alvorlig sykdom
Forenklet Mayo skår	Endoskopi er ikke medregnet • Antall poeng varierer fra 0-9 • Høyere skår = mer alvorlig sykdom