

Det norske barnevaksinasjonsprogrammet	
ALDER	VAKSINASJON MOT
6 uker	Rotavirussykdom
3 måneder	Rotavirussykdom Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae-type B- og hepatitt B-infeksjon (DTP-IPV-Hib-Hep B) Pneumokokksykdom (PKV)
5 måneder	DTP-IPV-Hib-Hep B og PKV
12 måneder	DTP-IPV-Hib-Hep B og PKV
15 måneder	Meslinger, kuma, røde hunder (MMR)
2. trinn (ca. 7 år)	DTP-IPV
6. trinn (ca. 11 år)	MMR
7. trinn (ca. 12 år), jenter og gutter	Humant papillomavirus (HPV), 2 doser
10. trinn (ca. 15 år)	dTP-IPV
Barn med foreldre fra høyendemiske land	Tuberkulose (BCG)*

Oversikt innføring nye vaksiner etter 2000	
Innført i 2006	
Pneumokokkonjugatvaksine	For spedbarn
Boosterdose DPT-vaksine	I form av kombinert DPT-poliovaksine i tidlig skolealder
Innført i 2009-2010	
HPV-vaksine	For jenter i 7. klasse
BCG-vaksinasjon	Til ungdomsskoleelever
Fra 2013-14	
Boosterdose DPT-vaksine	Flyttet fra 6. til 10. klassetrinn og supplert med lavdosert kikhostevaksine
Rotavirusvaksine	
Fra 2016	
Hepatitt B	For spedbarn. Gis i kombinasjon med vaksinen mot DPT, polio og Hib.
Fra 2018	
HPV	Gutter inkluderes i vaksinen