

Videre forløp:

Snorre Strøm forteller at smertene i nakken vedvarte utover vinteren -13, de varierte en del og han hadde gode og dårlige perioder. Han ble etter hvert også plaget med hodepine, mest i pannen, og også en følelse av svimmelhet og ustøhet som gjorde at han følte seg utilpass når han skulle gå i høyden på arbeidsplassen.

Dokumentasjonen viser en konsultasjon hos primærlege 14.02.13 hvor han fortsatt klaget over svimmelhet, inn i mellom magesmerter og av og til kvalme. Han følte også da at han konsentrerte seg dårligere enn før og nakkesmertene er beskrevet som periodevis relativt sterke. Han hadde også en klumpfølelse i halsen på denne tiden.

Ved neste konsultasjon 06.03.13 er det anført økende nakkesmerter og hodepine, svimmelheten var noe bedre og han ble henvist til fysioterapeut. Sommeren -13 har han ut fra journalopplysningene hatt det ganske bra, i notat 21.08.13 heter det:

"hatt det bra i ferien – nå akutte nakkesmerter – antydning til utstråling til venstre arm. Sterkt nedsatt bevegelighet i nakken ved klinisk undersøkelse, ingen nevrologiske utfall ellers ved en orienterende undersøkelse."

På dette tidspunkt ble han sykmeldt framover til 05.09.13. Plagene vedvarte en stund, han var sykmeldt til 20.09.13, gikk så tilbake i arbeid. På denne tiden gikk han og ventet på time hos nevrolog, primærlege hadde søkt ham dit våren -13. I et notat 22.10.13 er det anført at han hadde mer hodepine, men at nakken var relativt bra.

Undertegnede så ham 12.12.13 på Nevrologisk poliklinikk. Forløpet etter ulykken ble da beskrevet i min polikliniske journal som følger:

"de første dagene etter ulykken hadde han kraftige smerter, deretter avtok smerteplagene. Husker ikke helt hvordan forløpet så var de neste uker. Begynte imidlertid å få økende problemer med nakkesmerter og hodepine ut over senhøsten. Han klarte imidlertid å holde seg i arbeid, men det var problemer med forskjellige arbeidsstillinger. Merket ikke utstrålende smerter til overekstremitetene. Ingen gangproblemer eller vannlatingsproblemer. I tillegg hodepine, mest smerter i pannen og han hadde en subjektiv følelse av svimmelhet og ustøhet, nærmest av nautisk type."

Ved konsultasjonen anførte han videre at tilstanden hadde spontant bedret seg noe i den senere tid, han beskrev for meg bare hodepine og nakkesmerter noen få dager hver fjortende dag, disse plagene ble stort sett utløst av anstrengende arbeidsstillinger. Han fortalte også at hans kone klaget over at han var mer oppfarende og hissig enn før, men at han ikke selv var redd for at det hadde skjedd noen personlighetsendring. Videre mente han at han arbeidet like effektivt som før, han tror kanskje han snarere holdt et høyere enn et lavere tempo enn sine arbeidskolleger. Han anga å kunne miste tråden i samtaler og hadde problemer med å komme på navn, disse siste plagene mente han var kommet en tid etter ulykkeshendelsen.

Ved den kliniske undersøkelse fant jeg på dette tidspunkt en normal nevrologisk status og det var også normal bevegelighet i nakken, men det var trykkømheter særlig i overgangen mellom nakke og brystrygg i nivå C7/C8 samt noe trykkømheter i de lange ryggstrekker i tinning- og kjevemusklatur på begge sider.