

ETTER UNDERSØKELSEN

Har du fått bedøvende spray i munnen, kan du ikke spise eller drikke den første timen etter undersøkelsen.

Vanligvis kan du reise hjem med en gang etter undersøkelsen.

Er det gitt beroligende sprøyte kan du ikke selv kjøre bil før dagen etterpå.

RESULTATET AV UNDERSØKELSEN

Vanligvis får du vite resultatet av undersøkelsen med en gang. Resultatet og eventuelle prøvesvar vil også bli sendt til legen som har henvist deg.

Det tar ca. 2 – 3 uker å få svar på eventuelle prøver som er tatt.

UNDERVISNING

En av hovedoppgavene ved Oslo universitetssykehus er undervisning og forskning. Du vil derfor kunne bli spurt om at andre er tilstede under selve undersøkelsen.

Gastromedisinsk avdeling, Ullevål sykehus Medisinsk klinikk

Oppmøtested: Ullevål sykehus, Gastromedisinsk poliklinikk; bygg 6 – inngang 6A. 3.etg., ekspedisjon rom 3091.
Postadresse: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Gastromedisinsk poliklinikk, postboks 4959 Nydalen, 0424 Oslo.
Telefon: 22 11 94 06; mandag til fredag kl.10.00 – 11.30 og 13.00 – 14.30. Sentralbord: 02770
E-post til gastromedisinsk poliklinikk: gastromedisinsk.poliklinikk@ous-hf.no

Målgruppe: Pasienter til undersøkelse
Utgiver: Gastromedisinsk avdeling
Opplag: xx stk
Trykk: Lokal kopiering
Foto: Oslo universitetssykehus ©2010
Sist endret: 10.06.2013



Til deg som skal til:

Gastroskopi

En undersøkelse av mage og tarm med en spesiell sonde som har et lite kamera i spissen.

Viktig: Ikke spise eller drikke før undersøkelsen.

Bruker du Plavix, Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Marevan, må du stoppe med disse.

Hva er gastroskopi?

Et gastroskop er en bøyelig slange som er ca. 8 mm tykt med et kamera på tuppen som overfører bilder til en skjerm. Gastroskopet føres inn gjennom munnen og ned i spiserør, magesekk og tolvfingertarm.

HVORFOR GJØRES GASTROSKOPI?

Ved gastroskopi kan vi undersøke om det er sykdommer i spiserøret, magesekk eller tolvfingertarm.

Vi kan også ta vevsprøver (biopsi) og eventuelt behandle enkelte tilstander direkte via gastroskopet.

HVORDAN FORBEREDER JEG MEG?

Bruker du Plavix, Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Marevan, og fastlegen din ikke har bestemt noe annet, må du stoppe å ta disse medisinene for å redusere risikoen for blødning i forbindelse med undersøkelsen.

- Plavix må stoppes 7 dager før undersøkelsen.
- Pradaxa, Xarelto, Eliquis må stoppes dagen før undersøkelsen og undersøkelsesdagen.
Ta med deg medisiner slik at du kan ta disse etter utført undersøkelse.
- Marevan må stoppes 2 dager før undersøkelsen og i tillegg må du

møte for blodprøvekontroll 1 time før avtalt time. Blodprøve rekvisisjon får du i vår ekspedisjon bygg 6 i 3.etg.

- Bruker du Albyl-E kan du fortsette med denne.

Ta kontakt med avdelingen, dersom du har **kunstig hjerteklaff**.

Du må møte fastende, magesekken må være tom før undersøkelsen.

- Ikke spise eller drikke noe de siste 6 timene før undersøkelsen.
- Er du veldig tørst kan du drikke **1 – 2 glass vann** inntil 2 timer før undersøkelsen. Etter det kan du skylle munnen uten å svelge noe.

Har du **diabetes** og bruker insulin, kan du kontakte oss for å få timeavtale tidlig på dagen. Ta gjerne med deg mat til etter undersøkelsen.

Tar du **livsviktige medisiner** som ikke kan utsettes, kan du kontakte oss for å få en tidlig timeavtale.

Ønsker du en nærmere avklaring:
Telefon poliklinikken: 22 11 94 06
Hverdager kl.10-11.30 og 13-14.30


Kan du ikke møte til avtalt time, må du snarest ta kontakt med sykehuset.

UNDERSØKELSEN

Under **selve undersøkelsen** ligger du i venstre sideleie. Har du tannproteser må disse tas ut. Du får et munnstykke mellom tennene. Når gastroskopet kommer bak på tungen får du beskjed om å svelge.

Selv om dette kan oppleves ubehagelig så forsøk å slappe av og puste rolig mens undersøkelsen pågår.

Under undersøkelsen kan du puste normalt igjennom nese og munn.



Du ligger i venstre sideleie under selve undersøkelsen.

Det er vanligvis ikke behov for beroligende medisiner, men dette vurderes sammen med undersøkende lege.

Selve undersøkelsen tar vanligvis omkring 10 minutter.

HVILKE KOMPLIKASJONER KAN OPPSTÅ?

Komplikasjoner ved gastroskopi er svært sjelden. I helt spesielle tilfeller kan det oppstå blødning eller hull på spiserør, magesekk eller tolvfingertarm. Operasjon kan da bli nødvendig.

Ved mistanke om komplikasjon er det aktuelt med videre observasjon og eventuelt innleggelse på sykehuset.

Etter undersøkelsen kan du føle deg litt oppblåst og ha noe mageknip. Det er også vanlig å ha litt sår hals de første dagene etter undersøkelsen.

Hvis du får sterke magesmerter eller blodig oppkast etter at du er kommet hjem, må du kontakte sykehuset.

Behov for kontakt etter undersøkelsen; gjelder kun ved komplikasjoner:

Gastromedisinsk poliklinikk
Hverdager kl.08.00 – 15.30
Telefon 22 11 94 03

Akuttmottak hele døgnet
Telefon: 22 11 73 61

Forklar kort din situasjon og at du har vært til Gastroskopi på gastromedisin ved Ullevål sykehus.