

Handout (blank)

Modul 8: Behandling av Stenoser

Dette vedlegget er ment som et valgfritt hjelpemiddel som kan skrives ut. Svarene finnes i modulens innhold. Svarene kan brukes i modulens oppgaver og prøve.

Dilatasjonsbehandling

Indikasjoner

Indikasjon (Øsofagus)
_____ (vanligste)
Andre:
• _____ • _____ • _____ • _____
Indikasjon (Duodenum)
Bruker ballongdilatasjon i enkelte tilfeller ved:
• Duodenum stenoser fra: ○ _____ ○ _____ ○ _____ ○ _____
Indikasjon (tynn og tykktarm)
• _____ • _____ • IKKE _____

Komplikasjoner

Komplikasjon	Mer info	Tiltak
Litt blødning	• De fleste slike blødninger er _____	Ingenting.
Perforasjon	• Risiko _____% • Mortalitet opptil _____% • Unngå ved forsiktig blokkering, velg riktig _____. • Må erkjennes raskt når det skjer.	• _____ • _____ • _____ • Sett inn endoklips i tarm.

Stentbehandling

Indikasjoner

Indikasjon (Øsofagus)
• _____ (vanligste) • _____ (palliativt tiltak) • _____
Indikasjon (Duodenum)
• Kreft i pancreas – som gir _____ . Det er et alternativ til _____ .
Indikasjon (kolon)
• _____ (palliativ)

Komplikasjoner

Komplikasjon	Mer info	Tiltak
Klem i luftveiene	Stent er forbi en _____	Fjernes raskt
Stent migrasjon	Stent migrasjon skjer hyppig, særlig med hel _____. Typer av migrasjon: • _____ • _____ • _____	Kontrollere stentens plassering radiologisk _____ dager etter stenting.
Stent dysfunksjon	Stent dysfunksjon kan skje pga: • _____ • _____ • _____ • Benigne tilstander i øsofagus. _____ sitter fast i stenten	Ny _____ plasseres inni den opprinnelige.
Perforasjon	• Mortalitet opptil ____% • _____	• _____ • _____ • _____ • Sett inn endoklips i tarm.