

Vurdering av polypper

Det er flere komponenter i denne vurderingen:

- **Størrelse:** Jo større polypp, jo større sjanse for malignitet. <1cm er sjansen liten, >3 cm er sjansen stor. Men unntak finnes
- **Overflatemønster:** NICE type 3 (se egen leksjon) med uregelmessig eller fraværende mønster i overflaten, atypisk utseende kar eller helt manglende kar, bør gi mistanke om at det foreligger malignitet iallfall i dette området av polyppen. Og ett område er nok.
- **Fasong:** Nedsenkede områder, særlig sentralt i polyppen, gir mistanke om infiltrerende vekst.
- **Mobilitet og «lifting sign»:** Polypper som ikke er maligne begrenser seg til mukosa/submukosa, det betyr at de er mer mobile fordi de ikke er fiksert mot muskellaget utenfor. Ved å manipulere polyppen med f.eks. en biopsitang får man et inntrykk av dette. Imidlertid: Det viktigste tegnet på at det ikke foreligger infiltrerende vekst er at polyppen løfter seg når man injiserer væske på undersiden. Hvis den gjør det er infiltrerende vekst lite sannsynlig. Husk imidlertid at tidligere delvis reseksjoner og/eller recidiv kan føre til fibrose som gir manglende lifting sign, selv i benigne polypper. Biopsiering kan også gi fibrose. Lifting sign er også bare nyttig ved flate polypper (se senere). På stilkede polypper må en basere seg på de andre tegnene.